

WIELKOPOLSKA IZBA ROLNICZA APELUJE

POSIADASZ ŚWINIĘ? 1, 10 CZY 100?

PAMIĘTAJ O PRZESTRZEGANIU BIOASEKURACJI !!!

**Rolniku – nie czekaj aż ASF pojawi się w Twojej
okolicy! Drobne zaniechanie może kosztować
Ciebie i innych producentów trzody utratę
jedynego źródła dochodów!!!**



**RODZIMA PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ
JEST TAKŻE W TWOICH RĘKACH !!!**

ZAPOZNAJ SIĘ Z OBOWIĄZKAMI I ZAKAZAMI, KTÓRYCH MUSISZ PRZESTRZEGAĆ:

- REJESTRUJ KAŻDE ZDARZENIE W STADZIE ŚWINI W CIĄGU 7 DNI W ARIMR.
- ZABEZPIECZ BUDYNEK, W KTÓRYM UTRZYMUJESZ ŚWINIE PRZED DOSTĘPEM ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH ORAZ DOMOWYCH.
- UTRZYMUJ ŚWINIE W ODRĘBNYCH POMIESCZENIACH NIEMAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO PRZEJŚCIA DO POMIESCZEŃ, GDZIE UTRZYMYWANE SĄ POZOSTAŁE GATUNKI ZWIERZĄT KOPYTNYCH.
- ODKAŻAJ RĘCE I OBUWIE PRZED KAŻDYM WEJŚCIEM DO CHLEWNI.
- DO PRACY Z TRZODĄ UŻYWAJ ODZIELNEGO STROJU, KTÓRY POZOSTAWIASZ W CHLEWNI.
- ZADBAJ BY OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ŚWINI UŻYWAŁY ODZIEŻY OCHRONNEJ I STOSOWAŁY NIEZBĘDNE ŚRODKI HIGIENY ORAZ UPEWNIJ SIĘ CZY NIE WYKONYWAŁY TYCH CZYNNOŚCI W INNYM GOSPODARSTWIE.
- NIE WPUSZCZAJ NA TEREN CHLEWNI OSÓB POSTRONNYCH.
- ODKAŻAJ NA BIEŻĄCO NARZĘDZIA I SPRZĘT WYKORZYSTYWANY DO OBSŁUGI ŚWINI.
- NIE KARM ŚWINI ODPADAMI KUCHENNYMI, A PASZE ZABEZPIECZAJ PRZED DOSTĘPEM ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH.
- PRZED WEJŚCIEM DO BUDYKÓW INWENTARSKICH WYŁÓŻ MATY DEZYNFEKCYJNE I NA BIEŻĄCO UZUPEŁNIJ JE ŚRODKIEM DEZYNFEKUJĄCYM.
- PROWADŹ REJESTR ŚRODKÓW TRANSPORTU DO PRZEWOZU ŚWINI WJEŻDŻAJĄCYCH NA TEREN GOSPODARSTWA ORAZ LISTĘ OSÓB, KTÓRE WCHODZĄ DO POMIESCZEŃ, GDZIE UTRZYMUJESZ ŚWINIE.
- OBSERWUJ SWOJE STADO, A W RAZIE NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW NIEZWŁOCZNIE SKONTAKUJ SIĘ Z LEKARZEM WETERYNARII.
- NA TEREN SWOJEGO GOSPODARSTWA NIE WPROWADZAJ ZWŁOK, TUSZ, CZĘŚCI TUSZ DZIKÓW ORAZ PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH Z DZIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW, KTÓRE MOGŁY ZOSTAĆ SKAŻONE WIRUSEM.
- NIE OBSŁUGUJ ŚWINI, JEŚLI W CIĄGU OSTATNICH 72 H BRAŁEŚ UDZIAŁ W POLOWANIU.

DODATKOWO MOŻESZ CHRONIĆ SWOJE GOSPODARSTWO POPRZEZ:

- ODGRODZENIE CHLEWNI OD ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO PŁOTEM LUB ŚCIANĄ BUDYNKU.
- ZABEZPIECZENIE NIE TYLKO ŚCIOŁKI, ALE TAKŻE OBORNIKA PRZED DOSTĘPEM ZWIERZĄT DZIKICH.
- STOSOWANIE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI STAREJ SŁOMY, A ŚWIEŻĄ PO UPŁYWIE CO NAJMNIJ MIESIĄCA OD ZBIORU.
- STOSOWANIE MAT DEZYNFEKCYJNYCH PRZED BRAMĄ WJAZDOWĄ NA TEREN GOSPODARSTWA.
- OPRYSKIWANIE KÓŁ CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP SKUTECZNYM ŚRODKIEM WIRUSOBÓJCZYM.
- ZAMYKANIE BRAMY WJAZDOWEJ DO GOSPODARSTWA, CO UCHRONI PRZED WTARGNIĘCIEM OSÓB I POJAZDÓW POSTRONNYCH.
- NIE DOPUSZCZENIE DO KONTAKTU SAMOCHODU UTYLIZACYJNEGO Z CHLEWNIĄ – PADLINĘ NALEŻY WYWOZIĆ POZA TEREN GOSPODARSTWA, A NASTĘPNIE ZDEZYNFEKOWAĆ TEREN I SPRZĘT NATYCHMIAST PO ODJECHANIU SAMOCHODU. NIE WPUSZCZAĆ PRACOWNIKA FIRMY UTYLIZACYJNEJ NA TEREN GOSPODARSTWA.
- SPRZEDAŻ ZWIERZĄT W WYZNACZONYM MIEJSCU, A PO SPRZEDAŻY NATYCHMIAST DEZYNFEKOWAĆ TEREN I SPRZĘT.
- UNIKANIE MIEJSC, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ SKAŻONE PRZEZ DZIKI /OGRANICZENIE WIZYT W LESIE.

Bieżące informacje dotyczące działań podejmowanych w celu ograniczenia występowania ASF w stadach świń oraz informacje nt. bioasekuracji dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej www.wir.org.pl w zakładce ASF– bioasekuracja.

CZY WIESZ, ŻE:

- Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.
- Przeżywalność wirusa wynosi:
 - 5 miesięcy w chłodzonym mięsie,
 - 300 dni w szynce parmeńskiej,
 - 6 miesięcy w szpiku kostnym,
 - 18 tyg. we krwi i zwłokach świń (w temperaturze pokojowej),
 - 280 dni w zakopanej w ziemi (w śledzionie).
- Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
- Okres inkubacji choroby to 4 - 8 dni (maksymalnie 21 dni).
- Pierwszym objawem choroby jest gorączka 41° - 42°C.
- Do zakażenia zwierząt dochodzi:
 - poprzez przewód pokarmowy,
 - poprzez drogi oddechowe,
 - poprzez uszkodzoną skórę,
 - poprzez odbył,
 - poprzez krycie.
- Rezerwuarem wirusa mogą być:
 - dziki europejskie,
 - dzikie świnie afrykańskie,
 - guźce,
 - kleszcze.
- ASF jest chorobą nieuleczalną. Nie ma na nią szczepionki.
- Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez Inspekcję Weterynaryjną przy zwalczaniu ASF przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

WARUNKIEM JEGO WYPŁATY JEST JEDNAK PRZESTRZEGANIE ZASAD BIOASEKURACJI !!!